

MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: NÃO DEIXEM A DENGUE PRA DEPOIS, PODE DAR ZIKA E MICROCEFALIA.



Para evitarmos o avanço da MICROCEFALIA nos récem-nascidos, precisamos detectar os casos suspeitos de infecção pelo ZIKA, para bloqueio dos casos e monitoramento das gestantes. Notifique nos canais de comunicação acima.

INVESTIGUE QUALQUER DOENÇA EXANTEMÁTICA

Solicite exames de sangue para Dengue, Chikungunya e Zika.

- Em gestantes com um ou mais sintomas, coletar sangue para o exame do Zika até o 5º dia dos sintomas.
- Recém-nascido com microcefalia, coletar 3ml de sangue do cordão umbilical.
- Feto natimorto ou abortado com microcefalia, coletar 1 cm³ de tecidos de vários órgãos, conforme protocolo do Ministério da Saúde.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SINTOMAS	ZIKA	CHIKUNGUNYA	DENGUE
FEBRE	Sem febre ou subfebril, menos que 38°C (1 a 2 dias)	Alta, acima de 38°C (2 a 3 dias)	Alta, acima de 38°C (4 a 7 dias)
ARTICULAÇÕES DOR/EDEMA	++/+++ Frequentes, de leve intensidade	++/+++ Frequentes e de moderada intensidade	+/-+++ Raro
MANCHAS VERMELHAS NA PELE	Surgem no primeiro dia ou no segundo dia	Surgem entre 2 a 5 dias	Surgem a partir do quarto dia
INTENSIDADE DA DOR ARTICULAR	Leve / Moderada	Moderada / Intensa	Leve
CONJUTIVITE	50-90% dos casos	30% dos casos	Raro
CEFALEIA (frequência e intensidade)	++	++	+++
PRURIDO	Intenso	Leve	Leve
HIPERTROFIA GANGLIONAR	Intensa	Moderada	Leve
DISCRASIA HEMORRÁGICA	Ausente	Leve	Moderada
ACOMENTIMENTO NEUROLÓGICO	Mais frequente que na dengue	Raro (predominante em neonatos)	Raro

Agência Estadual de Vigilância em Saúde

Secretaria Estadual da Saúde



RONDÔNIA
Governo do Estado

PARCEIROS

